

## Fång

**Symptom** – Svårigheter att röra sig och ovilja att gå och att lyfta hovarna. Hovarna är varma och en ökad puls kan kännas vid kotan. Ibland ses hästen stå med framhovarna framför sig och bakhovarna under magen. Vid kraftig smärta kan hästen lägga sig för att avlasta hovarna.

**Diagnos** – Sjukdomshistoria och klinisk undersökning samt undersökning av den bakomliggande orsaken till att hästen får fång.

**Orsak** – Hästar och ponnyer kan drabbas av fång av många olika orsaker. Fång kan uppstå pga överbelastning av ett ben vid hålt på ett annat, vid blodförgiftning orsakat av t.ex. grovtarmsinflammation, vid feljästning i grovtarmen som kan uppstå vid överkonsumtion av t.ex. stärkelse samt i samband med vissa hormonella sjukdomar. Ekvint metabolt syndrom (EMS) och PPID, även kallat Ekvins Cushing, är två hormonella sjukdomar som drabbar häst som båda är kopplade till nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens) samt till en ökad risk för att drabbas av fång. Dessa två hormonella sjukdomar anses i dagsläget vara den vanligaste orsaken till att hästar och ponnyer drabbas av fång.

**Behandling** – I det akuta skedet rekommenderas boxvila på mjukt underlag, och behandling med smärtlindrande läkemedel enligt ordination av veterinär. Om hästen har fång pga. insulinresistens (alltså om hästen har EMS eller PPID) bör utfodringen korrigeras så snart som möjligt där hästen ska fodras en vallfoder baserad diet (hö, hösilage, ensilage) med lågt innehåll av lättlösliga kolhydrater (WSC), samt utan tillskott av stärkelse (i form av kraftfoder, betfoder mm). För att man ska kunna förebygga återfall av fång, så är det viktigt att man undersöker och behandlar den föreliggande sjukdomsprocessen.

**Vetfoder har hösilage med näringsvärden särskilt anpassat för hästar som drabbas av fång på grund av insulinresistens.**

